

Section 8 Outils de dépistage

Outils de dépistage et programmes offerts en Ontario

À considérer avant de procéder à l'examen de dépistage

Avant d'utiliser un outil de dépistage, tous les professionnels devraient répondre aux questions suivantes :

- ◆ Êtes-vous qualifié pour procéder à un tel examen?
- ◆ Savez-vous comment faire le suivi après l'examen si vous avez décelé un problème?
- ◆ Quel niveau de confidentialité respecterez-vous par rapport à l'examen? Comment assurerez-vous ce niveau de confidentialité?
- ◆ Où et quand aura lieu l'examen?
- ◆ Devez-vous tenir compte de l'aspect culturel lorsque vous faites l'examen? Voir à ce sujet la Section 2 et la Section 6 du présent guide.
- ◆ Savez-vous comment discuter avec la famille des questions délicates relatives à l'utilisation de l'outil de dépistage et à la communication des résultats de l'examen? Voir la Section 6 du Guide.
- ◆ L'outil de dépistage est-il fiable, exact et valide?
- ◆ Est-il impartial et non discriminatoire?
- ◆ Est-il facile à utiliser?
- ◆ Est-il économique?



Quel que ce soit le résultat de l'examen de dépistage, il importe d'aider les enfants et leur famille à obtenir le soutien, les ressources et les renseignements communautaires appropriés.

Veuillez prendre note que certains des outils dans la liste ci-dessous sont réservés à l'usage exclusif des professionnels ayant les qualifications et la formation appropriées.

Section 8 Outils de dépistage

Outils de dépistage offerts en Ontario

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
AIMS - Alberta Infant Motor Scale En anglais seulement. www.albertainfantmotorscale.com	Développement moteur	Bébés - de 0 à 18 mois	Détermination des retards de motricité dans quatre positions : couchée, ventrale, assise et debout.
ASQ-3 Questionnaire - âge et étape® Disponible en français, en anglais et en espagnol. www.agesandstages.com	Communication Motricité globale Motricité fine Résolution de problèmes Aptitudes individuelles ou sociales	De 1 à 66 mois	Le formulaire peut servir à remplir deux objectifs : ♦ cibler les nourrissons qui pourraient avoir besoin d'une évaluation plus approfondie; ♦ surveiller le développement des enfants à risque de souffrir d'une déficience ou d'un retard sur le plan développemental.
Dépistage dentaire	Santé buccale et dentaire	De 6 mois à 18 ans	Évaluation visuelle faite par une hygiéniste dentaire pour repérer un problème flagrant et pour cibler les enfants à risque d'avoir des caries dentaires en bas âge.
E.R.I.K. - Early Referral Identification Kit En anglais seulement.	Parole, langage et alphabétisme chez les jeunes enfants (centre moteur de la parole, articulation, bégaiement et troubles de la voix ou de la parole) Motricité globale et fine Aptitudes cognitives Aptitudes sociales Habilité à manger Développement sensoriel	De 6 mois à 4 ans	Outil de dépistage développemental créé par le Programme de services de rééducation de la parole et du langage pour les enfants d'âge préscolaire de la région de York pour cibler le plus rapidement possible les enfants à risque de retards de développement. Si on identifie un enfant à risque, on doit assurer un acheminement vers le service d'intervention précoce pour les troubles de la parole et du langage chez les enfants d'âge préscolaire et vers d'autres services au besoin.
http://childdevelopmentprograms.ca/resource_category/referral-forms/			

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
Échelle de dépression post-partum d'Edimbourg	Troubles de l'humeur post-partum ou Dépression pendant la grossesse	Mères avant et après la naissance, pères, parents adoptifs et parents de tout-petits.	Échelle largement utilisée pour repérer les femmes qui ont besoin d'une évaluation plus approfondie de la dépression post-partum ou de la dépression durant la grossesse.
Liste de contrôle des aptitudes liées à la communication Disponible en français, en anglais et en d'autres langues.	Langage et communication	De 6 mois à 4 ans	Liste de contrôle élaborée par le Toronto Public Health Speech and Language Services (services d'orthophonie pour les enfants d'âge préscolaire de la ville de Toronto). Cette liste aide les parents et les personnes chargées de subvenir aux besoins d'un enfant à évaluer si ce dernier a besoin de services d'orthophonie.
www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=7c4c45d26137a410VgnVCM10000071d60f89RCRD			
(LUI) TM - Language Use Inventory En anglais seulement.	Expression orale du langage et aptitudes en communication	De 18 à 47 mois	Questionnaire standardisé, validé empiriquement, à remplir par les parents pour repérer les enfants qui souffrent d'un retard considérable ou d'une déficience sur le plan de l'utilisation sociopragmatique du langage dans des situations quotidiennes. Génération automatique des résultats et d'un rapport qui montre les rangs-centiles obtenus par rapport à la norme (version électronique ou version papier offertes).
www.languageuseinventory.com			
M-CHAT-R - Liste de contrôle modifiée liée à la détection de l'autisme chez les tout-petits Disponible en anglais, en français et en d'autres langues.	Troubles du spectre autistique	De 16 à 30 mois	Liste de vérification à remplir par une personne responsable de l'enfant pour repérer les tout-petits qui pourraient bénéficier d'une évaluation plus poussée du développement et de l'autisme.
www.mchatscreen.com			

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
NutriSTEP^{MD} - Outil de dépistage de problèmes de nutrition chez les enfants d'âge préscolaire Disponible en français, en anglais et en d'autres langues. NutriSTEP^{MD} pour les tout-petits Disponible en anglais, en français et en espagnol. www.nutristep.ca	Nutrition, alimentation et déglutition	De 3 à 5 ans 18 - 35 mois	Questionnaire rempli par les parents servant à dépister les enfants d'âge préscolaire qui courent le risque d'avoir des problèmes d'alimentation. On traite, entre autres, de l'apport alimentaire et des nutriments; de la croissance physique; des capacités développementales et physiques; de la sécurité alimentaire et de l'influence du milieu dans lequel on nourrit les bébés. On recommande aux parents d'enfants à risque de consulter une diététiste ou leur médecin de famille.
Outil de dépistage dentaire En anglais seulement.	Santé buccale et dentaire	De 18 à 36 mois	Repérage précoce des enfants à risque d'avoir des caries dentaires en bas âge. Permet de surveiller la dentition des enfants. Offre également des conseils sur l'hygiène et les soins dentaires.
Questionnaire de dépistage Nipissing (NDDS) Disponible en français, en anglais et en d'autres langues.	Aptitudes affectives Motricité fine Motricité globale Aptitudes sociales Autonomie Communication Apprentissage et réflexion Vision et ouïe	D'un mois à six ans	Liste de contrôle universelle destinée aux parents pour dépister les problèmes de vision, d'ouïe, de communication, de motricité globale et fine, d'aptitudes cognitives, sociales et affectives et d'autonomie. L'outil fournit aux parents et aux professionnels de la santé et de puériculture un moyen pratique et convivial de suivre le progrès des bébés et des enfants d'un groupe d'âge donné. Le dépistage correspond au calendrier d'immunisation et aux étapes clés du développement jusqu'à l'âge de six ans. Il s'agit de l'outil le plus utilisé lors de la visite liée au bilan de santé amélioré à 18 mois. Le questionnaire est assorti d'activités appropriées à l'âge qui favorisent le développement global. www.ndds.ca/language-fr.php

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d'intervention précoce	Ouïe Émissions oto-acoustiques automatisées (EOA) Potentiel évoqué auditif automatisé du tronc cérébral (PEAATC)	De la naissance à 4 mois	Déceler un problème d'ouïe important chez les nouveau-nés et les nourrissons. Lors du deuxième dépistage, si les résultats s'inscrivent dans la colonne « acheminement », on doit soumettre le cas du bébé (sans frais) au service d'audiologie pour obtenir un diagnostic. Les enfants chez qui l'on décèle des facteurs de risque pour la perte auditive sont suivis jusqu'à l'âge de 30 mois.
www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/hearing/index.aspx			
Programme de dépistage néonatal de l'Ontario Feuillets de renseignements disponibles en français, en anglais et en d'autres langues.	Santé, avec l'utilisation de l'outil de dépistage néonatal	De 1 à 7 jours	Le Programme de dépistage néonatal de l'Ontario (PDNO) offre le meilleur outil de dépistage de maladies graves traitable chez tous les bébés nés en Ontario. Un dépistage précoce de ces maladies permet de traiter le bébé pour éviter des problèmes de croissance et de santé, le retard mental et le syndrome de la mort subite du nourrisson. À l'heure actuelle, cet outil permet de détecter 29 maladies. Consultez le site Web pour obtenir de plus amples informations.
www.newbornscreening.on.ca			
Programme d'intervention précoce auprès des enfants aveugles ou ayant une basse vision	Vision	De la naissance à la grade 1	Son objectif est d'informer et de soutenir les parents d'enfants nés aveugles ou avec une basse vision. Le programme offre du soutien aux familles, des interventions et des services de consultation.
www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/blindnesslowvision/index.aspx			
REEL-3 - Receptive, Expressive, Emergent Language Test En anglais seulement.	Langage	De la naissance à trois ans	Dépistage des différences entre le langage réceptif (la compréhension de l'enfant) et du langage expressif (la communication verbale de l'enfant).

Section 8 Outils de dépistage

Outil	Objectif	Tranche d'âge	Description générale
Relevé postnatal Rourke Disponible en français et en anglais.	Santé et développement	De la naissance à 5 ans	Outil de dépistage utilisé par les médecins de famille et les pédiatres pour évaluer le développement de l'enfant. Créé en 1979, cet outil a fait l'objet d'une révision en 2014. Il contient des données probantes liées aux paramètres de croissance et de développement. Il favorise l'éducation des parents (ou de la personne prenant soin de l'enfant) par le médecin.
www.cps.ca/fr/tools-outils//releve-postnatal-rourke			